

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА.

Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок – двух вакцинаций с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев и ревакцинации через 9-12 месяцев. Три прививки – это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита.

Какова схема экстренной вакцинации против клещевого энцефалита?

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между 1 и 2 прививкой (от 2 недель до 1 мес. в зависимости от вакцины) и проводится, как правило, перед сезоном в зимне-весенний период.

Ревакцинация проводится через 1 год после 2 прививки, в последующем – каждые 3 года.

Как вести себя после вакцинации? В день выполнения прививки от энцефалита необходимо соблюдать ряд правил: Отказаться от принятия ванны, бани и сауны. Место введения вакцины нельзя тереть мочалкой. В большинстве случаев прививка переносится легко. В зоне введения вакцины может возникать припухлость, покраснение, боль, которые проходят самостоятельно. В редких случаях может возникнуть гриппоподобное состояние (ломота, температура до 37,5, головная боль). У детей такое состояние встречается чаще, чем у взрослых.

Чем опасно посещение леса менее чем через 2 недели после завершения первичного курса вакцинации? У человека, который недавно вакцинировался от клещевого энцефалита, иммунитет к инфекции еще не сформирован, так как организму на это требуется время.

Общие противопоказания для прививки против клеща:

- Беременность..
- Аллергическая реакция на компоненты вакцины (гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ).
- Осложнения или сильная реакция на предыдущую дозу вакцины (повышение температуры выше 40⁰С, отеки, гиперемия более 8 см в диаметре в месте введения).
- Стадия острого заболевания и обострения хронических заболеваний, то вакцинацию проводят не ранее, чем через 1 месяц после выздоровления (ремиссии).
- Если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции на пищу и лекарственные вещества.
- Бронхиальная астма.
- Системные заболевания соединительной ткани.

- Соматические заболевания (тяжелые заболевания внутренних органов) в стадии суб- и декомпенсации (при обострении симптомов или нарушении нормального функционирования отдельного органа).
- Эпилепсия с частыми припадками.
- Диабет, тиреотоксикоз и другие заболевания эндокринной системы.
- Злокачественные новообразования, болезни крови.
- Возраст до 18 лет.